

Dosing On Call

Dosing for infants and children from your healthcare professional

DOSE: Every 4 hours as needed. DO NOT GIVE MORE THAN 5 DOSES IN 24 HOURS.

If possible, use weight to dose; otherwise, use age.


[ml = milliliter]

Infants' TYLENOL® Oral Suspension

Active ingredient: Acetaminophen 160 mg (in each 5 mL)

Available in:
 Grape
 Cherry
 Dye-Free
 Dye-Free

WEIGHT	6-11 lbs	12-17 lbs	18-23 lbs	24-35 lbs
AGE	0-3 months	4-11 months	12-23 months	2-3 years
DOSE	1.25 mL	2.5 mL	3.75 mL	5 mL



[ml = milliliter]

Children's TYLENOL® Oral Suspension

Active ingredient: Acetaminophen 160 mg (in each 5 mL)

Available in:
 Grape
 Dye-Free
 Cherry
 Dye-Free
 Raspberry
 Cherry

WEIGHT	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE	2-3 years	4-5 years	6-8 years	9-10 years	11 years
DOSE	5 mL	7.5 mL	10 mL	12.5 mL	15 mL




Children's TYLENOL® Chewables

Active ingredient: Acetaminophen 160 mg (in each tablet)

Available in:
 Grape
 Raspberry

WEIGHT	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE	2-3 years	4-5 years	6-8 years	9-10 years	11 years
DOSE	1 tablet	1½ tablets	2 tablets	2½ tablets	3 tablets



All infants' TYLENOL® and Children's TYLENOL® products have the same strength of acetaminophen: 160 mg (in each 5 mL or tablet).

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

Today's date: _____

This dosing recommendation from your healthcare professional will expire in **14 DAYS**.

- Always read and follow the label on all TYLENOL® products.
- Repeat dose **every 4 hours** while symptoms last.
- Do **NOT** give more than **5 doses in 24 hours**.
- Do **NOT** use with any other product containing acetaminophen.
- Use only the dosing device (syringe or dosing cup) that came with the product. Do not use any other dosing device.

DOSE: Every 6-8 hours as needed. DO NOT GIVE MORE THAN 4 DOSES IN 24 HOURS.

If possible, use weight to dose; otherwise, use age.

[ml = milliliter]


Infants' MOTRIN® Concentrated Drops

Active ingredient: Ibuprofen (NSAID)* 50 mg (in each 1.25 mL)

*Nonsteroidal anti-inflammatory drug

Available in:
 Berry
 Dye-Free
 Berry

WEIGHT	12-17 lbs	18-23 lbs
AGE	6-11 months	12-23 months
DOSE	1.25 mL	1.875 mL



[ml = milliliter]

Children's MOTRIN® Oral Suspension

Active ingredient: Ibuprofen (NSAID)* 100 mg (in each 5 mL)

*Nonsteroidal anti-inflammatory drug

Available in:
 Grape
 Berry
 Dye-Free
 Berry

WEIGHT	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE	2-3 years	4-5 years	6-8 years	9-10 years	11 years
DOSE	5 mL	7.5 mL	10 mL	12.5 mL	15 mL



IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

Today's date: _____

This dosing recommendation from your healthcare professional will expire in **14 DAYS**.

- Always read and follow the label on all MOTRIN® products.
- Repeat dose **every 6-8 hours** as needed.
- Do **NOT** give more than **4 doses in 24 hours**.
- Use only the dosing device (syringe or dosing cup) that came with the product. Do not use any other dosing device.

Be sure to keep TYLENOL® and MOTRIN® on hand for pain and fever relief that's

Always On Call

Dosis para bebés y niños




Dosis para bebés y niños recetada por tu profesional de cuidado de la salud

ADMINISTRAR: cada 4 horas, según sea necesario. **NO ADMINISTRES MÁS DE 5 DOSIS EN 24 HORAS.**
De ser posible, usa el peso para determinar la dosis; de lo contrario, usa la edad.

TYLENOL® Suspensión oral para bebés
Ingrediente activo: acetaminofeno 160 mg (por cada 5 ml)

PESO	6-11 lb	12-17 lb	18-23 lb	24-35 lb
EDAD	0-3 meses	4-11 meses	12-23 meses	2-3 años
DOSIS	1.25 ml	2.5 ml	3.75 ml	5 ml






Usar solo según las indicaciones.

Disponible en:
 Uva
 Cereza
 Cereza sin colorante

TYLENOL® Suspensión oral para niños
Ingrediente activo: acetaminofeno 160 mg (por cada 5 ml)

PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	5 ml	7.5 ml	10 ml	12.5 ml	15 ml



Usar solo según las indicaciones.

Disponible en:
 Uva
 Cereza
 Cereza sin colorante
 Goma de mascar
 Goma de mascar fresca

TYLENOL® Masticables para niños
Ingrediente activo: acetaminofeno 160 mg (por cada comprimido)

PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	1 comprimido	1½ comprimidos	2 comprimidos	2½ comprimidos	3 comprimidos

Usar solo según las indicaciones.

Disponible en:
 Uva
 Goma de mascar

Todos los productos **TYLENOL®** para bebés y **TYLENOL®** para niños tienen la misma concentración de acetaminofeno: **160 mg** (por cada 5 ml o comprimido).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO

- Fecha de hoy: _____
- Esta recomendación de dosis de tu profesional de cuidado de la salud vencerá en **14 DÍAS**.
- Lee y sigue siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los productos **TYLENOL®**.
 - Repite la dosis **cada 4 horas** mientras duren los síntomas.
 - NO** administres más de **5 dosis en 24 horas**.
 - NO** lo uses con ningún otro producto que contenga acetaminofeno.
 - Usa solo el dosificador (jeringa o vaso) que viene con el producto. No utilices ningún otro tipo de dosificador.




ADMINISTRAR: cada 6 a 8 horas, según sea necesario. **NO ADMINISTRES MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**
De ser posible, usa el peso para determinar la dosis; de lo contrario, usa la edad.

Motrin® Gotas Concentradas para Bebés
Ingrediente activo: ibuprofeno (NSAID)* 50 mg (por cada 1.25 ml)

*Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

PESO	12-17 lb	18-23 lb
EDAD	6-11 meses	12-23 meses
DOSIS	1.25 ml	1.875 ml

Usar solo según las indicaciones.


Disponible en:
 Frutos rojos
 Frutos rojos sin colorante
 Frutos rojos sin colorante

MOTRIN® Suspensión oral para niños
Ingrediente activo: ibuprofeno (NSAID)* 100 mg (por cada 5 ml)

*Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	5 ml	7.5 ml	10 ml	12.5 ml	15 ml

Usar solo según las indicaciones.

Disponible en:
 Uva
 Frutos rojos
 Frutos rojos sin colorante
 Goma de mascar
 Frutos rojos sin colorante

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO

- Fecha de hoy: _____
- Esta recomendación de dosis de tu profesional de cuidado de la salud vencerá en **14 DÍAS**.
- Lee y sigue siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los productos **MOTRIN®**.
 - Repite la dosis **cada 6 a 8 horas**, según sea necesario.
 - NO** administres más de **4 dosis en 24 horas**.
 - Usa solo el dosificador (jeringa o vaso) que viene con el producto. No utilices ningún otro tipo de dosificador.

Asegúrate de mantener los productos **TYLENOL®** y **MOTRIN®** a mano para aliviar dolores y fiebre y que estén

Siempre a tu lado